


## Übungsblatt 4

*Besprechung der mündlichen Aufgaben am 14.–18. 11. 2011*  
*Abgabe der schriftlichen Lösungen bis 11:10 am 23. 11. 2011*

**Aufgabe 23** *mündlich*

Ein (gerichteter) Graph  $G = (V, E)$  heißt (*stark*) *zusammenhängend*, wenn jeder Knoten  $y$  von jedem Knoten  $x$  aus über einen Weg in  $G$  erreichbar ist. Die bzgl. Teilgraphenordnung maximalen (*stark*) zusammenhängenden Teilgraphen von  $G$  bezeichnen wir als die (*starken*) *Zusammenhangskomponenten* von  $G$ . Dabei heißt  $G' = (V', E')$  *Teilgraph* von  $G = (V, E)$ , falls  $V' \subseteq V$  und  $E' \subseteq E$  gilt.

(a) Geben Sie die (*starken*) Zusammenhangskomponenten von folgenden (gerichteten) Graphen an:



- (b) Betrachten Sie die Relationen  $Z$  und  $S$ , wobei  $xZy$  ( $xSy$ ) genau dann gilt, wenn  $x$  und  $y$  in derselben (*starken*) Zusammenhangskomponente liegen. Wie lassen sich  $Z$  und  $S$  durch die Kantenrelation  $E$  ausdrücken? Begründen Sie.
- (c) Lösen Sie (a) und (b) für den *schwachen Zusammenhang* in  $G'$ . Hierbei sollen zwei Knoten  $x$  und  $y$  genau dann in derselben schwachen Zusammenhangskomponente eines Digraphen liegen (in Zeichen:  $xWy$ ), wenn  $y$  von  $x$  aus oder  $x$  von  $y$  aus über einen Weg erreichbar ist. *(mündlich, optional)*

**Aufgabe 24** *mündlich, optional*

Ein Graph  $G$  heißt *selbstkomplementär*, wenn er zu seinem *Komplementärgraphen*  $\bar{G}$  isomorph ist. ( $\bar{G}$  hat dieselbe Knotenmenge wie  $G$  und es werden genau die Knoten  $x \neq y$  durch eine Kante verbunden, die in  $G$  nicht verbunden sind.)


- (a) Zeigen Sie, dass ein selbstkomplementärer Graph zusammenhängend ist.
- (b) Wieviele nichtisomorphe selbstkomplementäre Graphen mit  $\leq 7$  Knoten gibt es?
- (c) Finden Sie mindestens einen solchen Graphen mit 8 Knoten.

**Aufgabe 25** *6 Punkte*

Seien  $E_1$  und  $E_2$  Äquivalenzrelationen auf einer Menge  $A$ . Sind dann auch  $E_1 \cap E_2, E_1 \cup E_2, E_1 \circ E_2$  Äquivalenzrelationen? Welche der drei Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie und Transitivität bleiben jeweils erhalten, welche nicht? Begründen Sie.


**Aufgabe 26** Gegeben sei nebenstehender DFA  $M$ . *mündlich*

- (a) Minimieren Sie  $M$  mit dem Verfahren aus der Vorlesung.
- (b) Bestimmen Sie den Index der Äquivalenzrelation  $R_{L(M)}$  und geben Sie ein Repräsentantensystem für  $R_{L(M)}$  an.



**Aufgabe 27** Gegeben sei nebenstehender DFA  $M$ . *10 Punkte*

- (a) Minimieren Sie  $M$  mit dem Verfahren aus der Vorlesung.
- (b) Bestimmen Sie den Index der Äquivalenzrelation  $R_{L(M)}$  und geben Sie ein Repräsentantensystem für  $R_{L(M)}$  an.



**Aufgabe 28** Sei  $\Sigma = \{0, 1\}$  und  $k \geq 1$ . *mündlich*

- (a) Bestimmen Sie einen Minimal-DFA für die Sprache  $L_k = \{x = x_1 \dots x_n \in \Sigma^* \mid n \geq k, x_k = 1\}$ .
- (b) Geben Sie einen NFA für die gespiegelte Sprache  $L_k^R$  mit höchstens  $k + 1$  Zuständen an.
- (c) Bestimmen Sie die minimale Anzahl von Zuständen eines DFA für  $L_k^R$ .
- \* (d) Geben Sie für jedes  $k \geq 1$  einen NFA  $N$  mit  $k$  Zuständen an, so dass jeder DFA für  $L(N)$  mindestens  $2^k$  Zustände hat. *(optional)*

**Aufgabe 29** Sei  $M = (Z, \Sigma, \delta, q_0, E)$  ein DFA und sei *8 Punkte*

$$D_i = \begin{cases} \{\{p, q\} \mid q \in E, p \notin E\}, & i = 0 \\ D_{i-1} \cup \{\{p, q\} \mid \exists a \in \Sigma : \{\delta(p, a), \delta(q, a)\} \in D_{i-1}\}, & i > 0 \end{cases}$$

die in der Vorlesung zur Minimierung von  $M$  benutzte Folge.

- (a) Zeigen Sie, dass  $D_i = \{\{p, q\} \mid \exists x \in \Sigma^{\leq i} : x \in L_q \Delta L_p\}$  ist. Dabei enthält  $\Sigma^{\leq n}$  alle Wörter in  $\Sigma^*$  der Länge höchstens  $n$ . *(mündlich)*
- (b) Zeigen Sie, dass  $D_j = D_{j+1}$  die Gleichheit  $D_j = \{\{p, q\} \subseteq Z \mid q \not\sim p\}$  impliziert. *(4 Punkte)*
- (c) Schätzen Sie die Anzahl  $\min\{j \geq 0 \mid D_j = D_{j+1}\}$  der benötigten Iterationen in Abhängigkeit von der Anzahl  $m = \|Z\|$  der Zustände von  $M$  möglichst gut nach oben ab. *(4 Punkte)*

*Hinweis:* Zeigen Sie, dass  $E_i = \{(p, q) \in Z^2 \mid \{p, q\} \notin D_i\}$  für jedes  $i \geq 0$  eine Äquivalenzrelation auf  $Z$  ist.

**Aufgabe 30** Sei  $\Sigma = \{a, b\}$ . *6 Punkte*

Geben Sie einen Minimal-DFA  $M$  für die Sprache der Wörter über  $\Sigma$  an, die *bbb* nicht als Teilwort enthalten. Beweisen Sie die Korrektheit und die Minimalität von  $M$ .